



## Principali precauzioni da considerare nell'assistenza ai pazienti con sospetta malattia da Ebola

Fonte: "Malattia da Virus Ebola (MVE) - Protocollo centrale per la gestione dei casi e dei contatti sul territorio nazionale" - Circolare 06/10/2014.



### Igiene delle mani

- Eseguire l'igiene delle mani con frizione alcolica o lavaggio con acqua e sapone nell'assistenza di tutti i pazienti: prima del contatto con il paziente, prima dell'esecuzione di una manovra sterile (in questo caso frizione alcolica o lavaggio antisettico), dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici ambientali, dopo il contatto con il paziente.

NB. L'uso dei guanti non è sostitutivo dell'igiene delle mani, che deve sempre essere effettuata.

Quando: Per tutti i pazienti con sospetto di Ebola



### Ambiente e attrezzature

- Nell'assistenza a pazienti con sospetta Ebola, è preferibile utilizzare attrezzature/dispositivi monouso o, se non possibile, dedicate. Tutte le attrezzature utilizzate su un paziente devono essere comunque ricondizionate prima dell'utilizzo su un successivo paziente (vedi dettagli nel testo).
- Le superfici ambientali devono essere decontaminate almeno una volta al giorno e in tutti i casi di effettiva necessità. Nell'assistenza a pazienti con Ebola utilizzare disinfettanti attivi su virus (ipocloriti). In caso di spandimento di liquidi biologici adottare le procedure indicate di seguito nel testo.

Quando: Per tutti i pazienti con sospetto di Ebola



### Prevenzione degli incidenti da aghi e taglienti

- Utilizzare dispositivi di sicurezza per il prelievo di sangue.
- Utilizzare sistemi a vuoto con provette infrangibili (Vacutainer).
- Eliminare i taglienti in modo sicuro negli appositi contenitori secondo le procedure aziendali.

Quando: Per tutti i pazienti con sospetto di Ebola



### Camice impermeabile

- Indossare un camice impermeabile con maniche lunghe se:
  - è possibile la contaminazione di cute e del camice nell'assistenza a un paziente con sospetta Ebola non ancora in isolamento (valutazione iniziale di un paziente che necessita di assistenza non differibile, trasporto del paziente).prima di entrare nella stanza di un paziente con sospetto di Ebola in isolamento ospedaliero in un reparto di Malattie Infettive.

Quando:

- Presa in carico iniziale se il paziente necessita di assistenza indifferibile.
- Durante il trasporto in ambulanza.
- Durante il ricovero in MI.




## Guanti

- Indossare i guanti se:
  - si prevede un possibile contatto con secrezioni, escrezioni, cute lesa, mucose o superfici contaminate nell'assistenza a un paziente con sospetta Ebola non ancora in isolamento (valutazione iniziale di un paziente che necessita di assistenza non differibile, trasporto del paziente).prima di entrare nella stanza di un paziente con sospetto di Ebola in isolamento ospedaliero in un reparto di Malattie Infettive.

Quando:

- Presa in carico iniziale se il paziente necessita di assistenza indifferibile.
- Durante il trasporto in ambulanza.
- Durante il ricovero in MI.



## Maschera e protezione degli occhi

- Indossare la mascherina chirurgica idrorepellente e protezione degli occhi (schermo facciale o occhiali EN 166) se:
  - si anticipa un possibile contatto con secrezioni, escrezioni, cute lesa, mucose o superfici contaminate nell'assistenza a un paziente con sospetta Ebola non ancora in isolamento (valutazione iniziale di un paziente che necessita di assistenza non differibile, trasporto del paziente).prima di entrare nella stanza di un paziente con sospetto di Ebola in isolamento ospedaliero in un reparto di Malattie Infettive.

Quando:

- Presa in carico iniziale se il paziente necessita di assistenza indifferibile.
- Durante il trasporto in ambulanza.
- Durante il ricovero in MI



## Facciale Filtrante FFP2

- Indossare in modo corretto il facciale filtrante FFP2 se:
  - si effettuano delle manovre che inducono la formazione di aerosol (es. somministrazione di farmaci con nebulizzazione, broncoscopia, bronco aspirazione, intubazione, ventilazione a pressione positiva) o il paziente presenta manifestazioni cliniche potenzialmente a rischio di generare aerosol (es. tosse).

**NB.** il Facciale Filtrante FFP2 non può essere indossato da chi ha la barba.

Quando: Nell'assistenza di pazienti con sospetto di Ebola quando si effettuano manovre che inducono la formazione di aerosol



## Trasporto del paziente

Far indossare al paziente una mascherina chirurgica durante il trasporto.

Quando: Per tutti i pazienti con sospetto di Ebola



## Stanza singola

- Collocare il paziente in una stanza singola con la porta chiusa, con servizio dedicato.
- Ridurre il numero di persone che hanno accesso alla stanza di isolamento
- Verificare che prima di entrare eseguano l'igiene delle mani, indossino i DPI raccomandati e che all'uscita rimuovano i DPI in modo corretto ed eseguano l'igiene delle mani

### Quando:

- Presa in carico iniziale se il paziente necessita di assistenza indifferibile.
- In attesa del trasporto.
- Durante il ricovero in MI.